

پیماری فائوسیم





علائم اولیه بیماری فاویسم :

درد در ناحیه ی کمر . استفراغ . سرگیجه . زردی بدن و چهره و ادرار پررنگ است که در نهایت ممکن است به ضعف عمومی منجر بشود .

زمانی که نشانه های اولیه در فرد مبتلا به بیماری فاویسم بروز می کند حتما وی را به نزدیک ترین بیمارستان منتقل نمایید . در موارد شدید درمان اولیه تزریق خون است . بیمار بهتر است مایعات شیرین مانند کمپوت و آبمیوه ی فراوان بنوشد . این بیماری ممکن است در دوره ی نوزادی به صورت زردی بروز کند که معمولا ر تباطی با مصرف باقالی ندارد و درمان آن فتوتراپی خواهد بود . خوشبختانه بیماری فاویسم قابل پیشگیری است . در صورتی که از کمبود آنزیم مربوطه در فرزند ان خود آگاهی ندارید توصیه میگردد از خوردن باقالی یا تماس با آن خودداری نمایید . فردی که یک بیمار فاویسمی ددر خانواده اش وجود دارد بایستس سایر افراد را نیز مورد

این بیماری در اثر خوردن باقالی به ویژه باقالی خام و حتی با عبور کردن از کشتزارهای باقالی و هم چنین بعضی از داروها مانند آسپرین بروز می کند در افرادی دچار آنزیمی به نام «G6OPD» می باشد .

خوردن باقالی یا سایر مواد اکسیدان یا حتی تماس با آنها باعث تجزیه ی خون (همولیز) و در نتیجه کم خونی می شود . در حقیقت این افراد دچار بیماری فاویسم می باشند .

این بیماری ارثی است ولی مسری نیست و از فردی به فرد دیگر منتقل نمی شود . فصل بروز و شوع این بیماری بهار است زیرا در این فصل باقالی به فراوانی وارد بازار می شود و مخصوصا در منطقه ی شمال و خوزستان شیوع بیشتری دارد .

این بیماری بیشتر در جنس مذکر بروز میکند و در هر سنی ممکن است اتفاق بیافتد . اما بیشترین سن ابتلا به این بیماری ۲ تا ۶ سالگی است .

مواردی که سبب ابتلا به بیماری فاویسم می گردد:

- باقالی به هر شکل
- برخی عفونت های ویروسی یا باکتریایی
- داروهای ضد ملاریا (پریکمن، پاکتاسین، کینوسد، کیناکرین، آتاپرین و کنین)
- کوتریماکسیزول و ترکیبات مشابه
- کلرامفنیکل، سولفاستامید
- ترکیبات نیترو فورازدل شامل: فوروکسین، فورودانتین و فورادین
- نالیدیکسیک اسید (نگرام)
- مسکن ها و تب برها
- ویتامین k به غیر از k₁ به صورت محلول در آب - ویتامین ث
- پروپنیسید: فنیل هیدرازین، ایزونیاژید یا بدون تری نیترو تولوئن، بلودومتیلن، دی مرکاپرول، کنیدین، نفتالین، رنگ شامل آنیلین.

آزمایش اختصاصی قرار دهد تا از وجود یا عدم وجود این بیماری اطلاع پیدا کند. نام این آزمایش اندازه گیری «G6PD» می باشد.

در افراد مبتلانات زیر رعایت گردد:

- از کشتزار های باقالی عبور نکنند و به باقالی و گل آن دست نزنند.
- اگر فرد بیماری در خانه است بهتر است که در خانه باقالی پاک نشود
- نفتالین در نزدیک این بیمار نباشد
- رنگ های ساختمانی به طور کلی ضرر دارند
- مادر شیرده از مصرف باقالی بپرهیزد زیرا از راه شیر به فرزند منتقل میشود
- در اتقاق افراد فاویسمی نباید از اپری های حشره کش استفاده کرد
- در موارد الزامی پیش از مصرف هر گونه دارو با پزشک مشورت شود.





بیماری فایوایسم



@saremhospitalnews



instagram.com/saremhospital



www.Saremhospital.org



Sareminfo1393@gmail.com

تهران، شهرک اکباتان، انتهای فاز ۳

کدپستی: ۱۳۹۶۹۵۶۱۱۱

تلفن: ۴۷۰۲ - ۰۲۱ فکس: ۴۴۶۷۰۴۳۲

دفتر پرستاری - واحد آموزش

۹۹۷۵-۹۳۰۰۳۴